

Dr. Meg Miklosvary AuD

Helix Hearing

Einfluss von Hörverlustgrad, Alter und Geschlecht auf die selbstberichtete Häufigkeit und den Grad von Hörproblemen.

Die Erwartungen an eine Rehabilitation können die Realität übertreffen. Was wäre jedoch, wenn Audiologen ihre Patienten anhand von Daten besser auf die erwarteten Ergebnisse vorbereiten könnten?

Mithilfe des Tools „Personal Assessment of Communication Abilities“ (PACA), bei dem Patienten ihren Grad der Hörbehinderung in zwölf gängigen Kommunikationsumgebungen bewerten, wurden Daten von über 6.000 Patienten sowie audiometrische Informationen zu Alter und Geschlecht erhoben.

Häufigkeit und Grad der Hörbehinderung wurden für die Gruppen mit normalem, leichtem und mittelschwerem Hörverlust analysiert. Jede dieser Gruppen wurde zusätzlich auf Alters- und Geschlechtseffekte untersucht.

Diese Daten ermöglichen es Audiologen, Patienten frühzeitig im Rehabilitationsprozess altersgerechte Erwartungen zu vermitteln. Patienten sind gut informiert und können so besser entscheiden, ob der zeitliche und finanzielle Aufwand für die Rehabilitation ausreichend ist. Dieses zusätzliche Beratungsinstrument dürfte zu besseren Hörgeräteergebnissen und einer geringeren Rücklaufquote führen.